

nackte Augenhaut nach vorn begrenzt und sich oben mit den Kopffedern, unten mit den Ohrfedern vereint, schwarz. Nackte Augenhaut und verlängerte Hautfalte am Mundwinkel gelblich. Karunkeln der Kehle orange. Rücken bräunlich, die Federn des Oberrückens mit Weiss und Bräunlichweiss gesäumt. Unterseite schwärzlich, auf der Brust einzelne weisse Flecke, auf Bauch und Unterleib die meisten Federn mit weisslichen und hellbräunlichen Endflecken. Schwingen-Oberseite bräunlich mit lebhaft olivenfarbenen Rändern an den Aussenfahnen; Unterseite graulich mit hellbräunlichen Säumen an dem Basaltheil der Innenfahnen. Untere Flügeldeckfedern schwärzlich und hellbraun melirt. Schwanz-Oberseite bräunlich, mit etwas helleren Rändern an den Aussenfahnen, Unterseite grau.

Schnabel blaugrau mit hellerer Spitze. Füsse und Krallen schwärzlichgrau mit helleren Fusssohlen.

Fundort: Hattam, auf dem Arfakgebirge im Nordwesten Neu-Guinea's circa 3500' hoch, Juli 1873. Ich erbeutete nur ein Männchen.

Masse:	Totallänge	270 Mm.
	Flügelänge	130 „
	Schwanzlänge	circa 120 „
	Schnabel von der Stirn	38 „
	Tarsen	35 „

Melirrhophetes ochromelas n. sp.

Kopf schwarz, nur ein schmaler Augenbrauenstreif und die Enden der Ohrfedern bräunlich. Nackte Augenhaut und verlängerte Hautfalte am Mundwinkel gelblich. Karunkeln der Kehle orangeroth. Oberseite bräunlich; die Federn des Oberrückens mit Weiss gesäumt; Unterseite schwärzlich, nur auf dem Unterleib einige weisse Säume. Schwingen wie bei *Melirrhophetes leucostephes*, nur dass die Ränder der Aussenfahnen gesättigter, mehr ockerfarbig sind. Schwanz ebenfalls wie bei *leucostephes*, nur die Ränder der Aussenfahnen lebhaft gelblich gefärbt.

Schnabel blaugrau mit hellerer Spitze. Füsse gelblich-fleischfarben. Krallen dunkler.