

dann in den Monaten August bis November. Unter den vielen Arten kommen nur *P. aeneus* und *atratus* nicht selten vor. Gattung: *Paederus*. Erscheint im Frühjahr, dann in den Monaten August bis November. Die Epochen des Maximums kommen im März und September vor. Sehr gemein: *P. littoralis*. Gattung: *Stenus*, fast so artenreich wie *Philonthus*, erscheint von der Mitte März bis um die Mitte Mai, dann von Juli bis November. Eine auffallend vorherrschende Art kommt nicht vor. Für die gemeinen Arten der so eben betrachteten Familie erhält man demnach folgende Resultate:

	I. Max.	II. Max.	$x=0$	
<i>M. canaliculata.</i>	März,	Sept. 10.	Juni bis 10.	Aug. = 61 Tage.
<i>S. caesareus.</i>	Mai,	Aug. 16.	„ „ 4.	„ = 49 „
<i>S. murinus.</i>	„	? 23.	„ „ 13.	„ = 51 „
<i>O. similis.</i>	März,	Sept. 12.	„ „ 10.	„ = 59 „
<i>P. aeneus.</i>	April,	Oct. 4.	Juli „ 10.	„ = 37 „
<i>P. atratus.</i>	März,	Sept. ? 16.	„ „ 14.	Sept. = 60 „
<i>Pae. littoralis.</i>	„	„ 24.	Mai „ 10.	Aug. = 78 „
			im Mittel = 56	„

Ich habe den Beobachtungen, welchen die bisher mitgetheilten Resultate entnommen worden sind, absichtlich deshalb eine möglich grosse Ausdehnung gegeben, um jene Arten zu ermitteln, welche am meisten verbreitet sind, weil sich dieselben am besten zu vergleichenden Beobachtungen eignen, mögen diese sich an demselben Orte auf verschiedene Jahre, oder in demselben Jahre auf verschiedene Orte beziehen. Ich will daher hier zu diesem Zwecke ein alphabetisches Verzeichniss der Arten geben, welches durch fortgesetzte Beobachtungen in so ferne einer Revision zu unterziehen sein wird, als in einem Jahre manche Art häufig vorkommen kann, welche es in dem andern nicht ist.

Verzeichniss der Arten, welche für die Beobachtung über die jährliche Periode anempfohlen werden können.

<i>Adimonia tanaceti.</i>	<i>Anthonomus equestris.</i>
<i>Agelastica alni.</i>	<i>Anthrenus serophulariae.</i>
<i>Agriotes graminicola.</i>	<i>Aphodius elevatus.</i>
„ <i>sputator.</i>	„ <i>fimetarius.</i>
<i>Amara apricaria.</i>	„ <i>fossor.</i>
<i>Amphimallus solstitialis.</i>	„ <i>inquinatus.</i>
<i>Anchomenus prasinus.</i>	„ <i>melanosticus.</i>
<i>Anomala julii.</i>	<i>Apion craccae.</i>